柑橘

# ７月の農作業管理

周防大島統括本部

**重点作業**　**「一果入魂」こだわりを持った生産管理に努めよう**

## 作業１　摘果　（表年の樹は早めの摘果で温州みかんはＭ、Ｌ中晩柑はＬ、２Ｌ生産をしましょう）

| 品種 | 時期 |
|---|---|
| 極早生・早生 | ７月上旬 |
| 中生・普通温州 | ７月中旬 |

※小玉果、裾なり果、内なり果、傷果、奇形果、病害虫の被害果などが摘果対象です。
※高糖系でも、着果過多樹は樹幹内部の摘果を行う。

| 品種 | 時期 | ポイント |
|---|---|---|
| 宮内伊予柑 | ７月上旬（早めに） | 葉数 100 枚に１果程度に摘果 |
| 太田ポンカン | | |
| デコポン | | |
| せとみ | | |

＊大玉生産のため早期摘果を心がける
＊葉陰、内なりの果実は見落しやすいので注意する

※着果量の多い樹は「早く・強く・速く」取り組もう。

## 作業２　病害虫防除

**黒点病の薬剤は果実の表面を覆う「保護剤」で降雨および紫外線による分解で効果が低下してきます。一度散布してからの積算降雨量が、２００㍉（晴天続きでも３０日）までに再散布（早めの再散布を）をしましょう。**

| 時期 | 病害虫 | 防除薬剤 | |
|---|---|---|---|
| ７月上中旬 | 黒点病（３回目）<br>アザミウマ類・ミカンサビダニ<br>樹勢強化 | エムダイファー水和剤<br>アグリメック<br>スイカル（カルシウム剤） | ６００倍<br>2,000倍<br>５００倍 |
| ７月下旬 | （株元散布）ゴマダラカミキリの産卵防止 | モスピラン顆粒水溶剤 | ２００倍 |
| | 黒点病（４回目）<br><br>ミカンバエ成虫 | ジマンダイセン水和剤　４００～６００倍<br>※中晩柑は６００倍で使用<br>コルト顆粒水和剤 | 3,000倍 |

◎スダイダイの防除は７月以降しない。

## 作業３　苗木の管理

●灌　水…１樹当たり１０リットル灌水する
●芽かぎ…１節当たり強い芽を１本と弱い芽を１～２本残して他は間引く
●施　肥…７月上旬（追肥）
　・１年生:　柑橘有機配合１号約 70g/樹　・２年生:　柑橘有機配合１号約 90g/樹
●エカキムシ　ダントツ水溶剤　２０倍（樹幹散布）
●緑化促進　　尿素　５００倍

## 作業４　タイベックマルチの被覆

着色促進・糖度アップを目的に、マルチ被覆に取り組もう！

| 品種 | 被覆時期 | 事前準備 |
|---|---|---|
| 極早生（日南姫含む） | 被覆してない園は早急に（７月上旬） | ※排水対策<br>（溝切り、溝上げ）<br><br>※除草・園内の整地 |
| 早生 | 傾斜地（７月中旬）水田転換園（７月上旬） | |
| 中生・大津 | 水田転換園（７月中旬） | |
| 普通温州・高糖系 | 傾斜地（８月中旬）、水田転換園（７月中旬） | |

## 作業５　フィガロンによる熟期促進（１回目）

| 品種 | 散布時期 | 使用倍率 |
|---|---|---|
| 極早生・早生 | 満開後６０日（７月中旬） | ２，０００倍 |
| 普通・高糖系 | 満開後７０日（７月下旬） | |

※樹勢の弱った樹は散布を控えましょう。

## 作業６　かぶさり枝の除去

裏年の樹は春芽が多く発芽して、下の果実にかぶさっているので枝の除去をして果実に日があたるようにしましょう。

## 落葉果

| | 病害虫 | 防除薬剤 | 重点管理 |
|---|---|---|---|
| モモ | 黒星病<br>シンクイムシ | トップジンM水和剤１,０００倍<br>モスピラン顆粒水溶剤　４,０００倍 | |
| 西条柿 | ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ<br>炭疽病、落葉病 | コテツフロアブル　２,０００倍<br>ジマンダイセン水和剤　６００倍 | 仕上げ摘果…生理落果の終了する７月上旬～中旬に行う |
| キウイ | 軟腐病 | フロンサイドＳＣ　２,０００倍 | 摘芯…結果部から１０節くらいの先端部で行う |

※キウイの防除には必ず展着剤としてアビオン-E の１,０００倍を加用散布する

## 野菜

| | 病害虫 | 使用薬剤 | 使用倍率 | 収穫前日数 | 使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| キュウリ | うどんこ病<br>べと病 | ダコニール 1000 | 1,000 倍 | 前日 | 12 回 |
| | アブラムシ | ダントツ水溶剤 | 4,000 倍 | 前日 | ３回 |
| ナ　ス | テントウムシダマシ | ダントツ水溶剤 | 4,000 倍 | 前日 | ３回 |
| | チャノホコリダニ | コテツフロアブル | 2,000 倍 | 前日 | ４回 |
| トマト<br>スイカ | アブラムシ | ダントツ水溶剤 | 4,000 倍 | 前日 | ３回 |

## 水稲

**病害虫防除**

コシヒカリで７月上旬に**トビイロウンカ、**下旬に **コブノメイガ、紋枯病**の発生が見られるときは防除を行って下さい。防除剤は栽培暦を参照して下さい。

ひとめぼれで７月中旬に**トビイロウンカ、**８月上旬に **コブノメイガ、紋枯病**の発生が見られるときは防除を行って下さい。防除剤は栽培暦を参照して下さい。

８月上旬カメムシ防除（コシヒカリ）の１回目を穂揃期に行ってください。防除剤は栽培暦を参照して下さい。

**農薬の飛散に十分注意してください！**

**◎営農相談フリーダイヤル　　０１２０－０８２－７２２**